



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๕ / ๑๑ / ๒๕๖๒

ที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว ๖๗๕๐๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซเซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็มทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ ๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มีอายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซเซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในกรณีนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่องการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซเซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซเซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturlasia/ATqEL> สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและเทศบาลนครสกลนคร ก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๘.๓ /ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- ฝ่าย บพ. กง.กฎหมาย
 กง.มาตรฐานฯ กง.การเงินฯ
 กง.ส่งเสริมฯ กง.บริการฯ



สมจ.ณ.
 เลขที่รับ 6105
 วันที่ 27 ส.ค. 2567

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๕๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

กลุ่มงานบริการ...
 เลขที่รับ 585

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า กระทรวงสาธารณสุข
 แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรเซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็มทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ
 ๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มี
 อายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน
 ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 เป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรเซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
 โรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่องการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)
 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้
 และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรเซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากร
 ทางแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
 ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรเซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่
<https://shorturl.asia/ATqEL> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

ว่าที่ร้อยตรี สันติ ศาสตร์ช่วง

กรมควบคุมโรค
เลขที่ ๑.163
15 ส.ค. 2567
15.51



กรมควบคุมโรค
เลขที่ 37305 1
15 ส.ค. 2567
รศค.

ที่ สธ ๐๔๓๐.๑๑/ว ๒๕๖๖

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซลส์ (aP) จำนวน ๑ เข็ม
ทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ ๒๖ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอด
ภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มีอายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วย
อย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซลส์ (aP) สำหรับ
หญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน และการป้องกันโรค
ไอกรนด้วยวัคซีน เรื่อง การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีน
ป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซลส์ ในหญิงตั้งครรภ์ สามารถดาวน์โหลดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิชาติ วชิรพันธ์
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป
โทร. ๐ ๒๕๕๕๐ ๓๑๔๖ - ๗
โทรสาร ๐ ๒๕๕๕๐ ๓๑๔๖



คลิป์วิดีโอ เว็บไซต์
กองโรคติดต่อทั่วไป

ฉีดวัคซีนป้องกันไอกรน (aP) ในแม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคสู่ลูก



ป้องกัน⁺

การป่วยจากโรคได้

93%



ลดการป่วย

รุนแรงได้

90.5%

แนะนำให้ฉีดวัคซีนไอกรน (aP) 1 เข็ม ทุกการตั้งครรภ์
(อายุครรภ์ที่แนะนำ 20-32 สัปดาห์)



หญิงตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน

วันที่ 14 พ.ค. 67

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

สายด่วน
1422

วัคซีน ป้องกันโรคไอกรน

ชนิดไร้เซลล์ (Pertussis (acellular) : aP) ในหญิงตั้งครรภ์



โรคไอกรน คืออะไร?

โรคไอกรน เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อปอดและเยื่อหุ้มปอด



ไอรุนแรง ในเด็กเล็กอาจมีอาการไอเป็นชุด ๆ ทำให้หายใจไม่ทันจนเกิดภาวะขาดออกซิเจน

อาจหยุดหายใจจนเสียชีวิตได้

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเมื่อได้ร่างกายของสตรีตั้งครรภ์ที่แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และส่งผลต่อภูมิต้านทานแม่ไม่เพียงพอ เมื่อให้ทารกที่คลอดออกมาได้ภูมิคุ้มกัน

ป้องกัน
การเสียชีวิตทารกได้ **93%**

ลดการป่วย
บุตรแรกเกิดของแม่ได้ **90.5%**



บุคคลที่ไม่ควรได้รับวัคซีน

- เคยมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ หรือ ปัญหาอื่นที่รุนแรงจากวัคซีนนี้มาก่อน
- มีภาวะผิดปกติทางสมอง หรือเด็กช็อคชั่วนิรันดร์ไม่ได้
- มีไข้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน

อาการข้างเคียง ที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีน

- ปวดบวม แดง บริเวณที่ฉีด และอาจทำปฏิกิริยาแพ้ที่รุนแรง เช่น ไข้สูง ภาวะแพ้ยา หรือ ภาวะแพ้ยาแพ้รุนแรง
- อาการแพ้รุนแรง ไข้สูง มีผื่นที่ตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อนแรง

สามารถเข้ารับบริการได้ อย่างไร?

หญิงตั้งครรภ์สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน



ฉีดวัคซีนอย่างไร?

แนะนำให้ฉีดวัคซีนไอกรน (aP) 1 เข็ม ทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ 20 - 32 สัปดาห์

ข้อควรปฏิบัติ หลังรับวัคซีน

- งดสังคุดอาหาร 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน
- สถานที่ที่มีการสะสมความชื้นหรืออากาศร้อนในบ้าน
- หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ควรแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนรับวัคซีนครั้งต่อไป
- หากปวด บวม บริเวณที่ฉีด ให้ประคบด้วยผ้าเย็น และหากมีไข้ให้รับประทานยาตามวิธี
- หากรับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้รุนแรง ควรรีบพบแพทย์
- ควรรับวัคซีนตามกำหนดและเก็บสมุดบันทึกการรับวัคซีนไว้ตลอดไป
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข



ที่มา : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค